

BELATACEPT (IV) : NULOJIX®

NULOJIX 250MG PERF FL+SRG 1 (UCD : 9373607)

Indication AMM	Statut	Agrément aux collectivités	Prise en charge en sus des GHS	Evaluation Commission de Transparence (CT HAS)	Lien avis CT HAS
Indication					
En association aux corticoïdes et à l'acide mycophénolique (MPA), est indiqué en prévention du rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale Instauration au moment de la transplantation	AMM 17/06/2011	OUI JO du 03/01/2012	<p style="text-align: center;">OUI JO du 09/02/2023 Code LES : I000614</p> <p>"En association aux corticoïdes et à l'acide mycophénolique (MPA), est indiqué en prévention du rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale dans la prise en charge des patients non immunisés avec un statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr"</p> <p style="color: red; font-size: small;">Remarque : Code LES I000617 dans les autres populations de patients greffés [sans statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr et sans greffon rénal issus de donneurs vivants ou décédés à critères standards] (INTRA GHS) cf ci-dessous</p>	<p>Avis CT du 30/11/2011 Inscription aux collectivités SMR IMPORTANT ASMR IV dans la prise en charge des patients jeunes, avec un statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr et bénéficiant d'un greffon rénal issus de donneurs vivants ou décédés à critères standards ASMR V dans les autres populations de patients greffés</p>	30/11/2011
				<p>Avis CT du 09/07/2014 Réévaluation ASMR IV en termes de moindre altération de la fonction rénale, dans la prise en charge des patients avec un statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr et avec greffon rénal lésé d'emblée ou présentant une altération de la fonction rénale</p>	09/07/2014
				<p>Avis CT du 09/11/2016 Réévaluation ASMR IV en termes de moindre altération de la fonction rénale, dans la prise en charge des patients non immunisés avec un statut immunologique positif pour le virus Epstein-Barr</p>	09/11/2016
				<p>Avis CT du 19/07/2023 Réévaluation Pas de modification</p>	19/07/2023
Indication					
En association aux corticoïdes et à l'acide mycophénolique (MPA), est indiqué en prévention du rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale Conversion à partir d'un traitement incluant un inhibiteur de la calcineurine (ICN) au moins 6 mois après la transplantation	AMM 01/06/2021	OUI JO du 21/02/2023	<p style="text-align: center;">NON (INTRA GHS) Code LES: I000617</p> <p>"En association aux corticoïdes et à l'acide mycophénolique (MPA), est indiqué en prévention du rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale dans les autres populations de patients greffés, incluant les patients en conversion à partir d'un traitement incluant un inhibiteur de la calcineurine (ICN) au moins 6 mois après la transplantation"</p>	<p>Avis CT du 21/09/2022 : Extension d'indication SMR IMPORTANT ASMR V dans la prévention du rejet du greffon recevant une transplantation rénale dans le cadre d'une conversion d'un ICN.</p>	21/09/2022



[\(01/07/2020\) Inscription sur le liste des rétrocessions](#)

[\(23/09/2020\) Publications des conditions de prise en charge dans le cadre de la rétrocession](#)

[\(21/02/2023\) Publications des conditions de prise en charge dans le cadre de la rétrocession \(extension d'indication\)](#)