



FLASH INFO SPECIAL

Semaine de la Sécurité du Patient

n°03 - 26 novembre 2014

1. La phrase du jour :

Le facteur le plus lié à la thrombose de stent coronaire est l'absence de thérapie antiagrégante⁽¹⁾.

La **double anti-agrégation plaquettaire** doit être maintenue **6 à 12 mois** après la pose d'un stent actif et tout geste chirurgical durant cette période doit faire l'objet d'une **concertation pluridisciplinaire**.

2. La fiche du jour



« Stents coronaires actifs et bithérapie anti-agrégante »

Que vous trouverez en pièce jointe ou que vous pouvez télécharger sur le site [e-OMEDIT Midi-Pyrénées/galerie de fichiers/« 18-Midi-Pyrénées - Semaine de la sécurité des patients »](http://e-OMEDIT.Midi-Pyrénées/galerie_de_fichiers/«_18-Midi-Pyrénées_-_Semaine_de_la_sécurité_des_patients_»)

(1) Bon usage des antiagrégants plaquettaire, Argumentaire HAS juin 2012



L'OMEDIT reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire

Pour vous rendre sur le site de l'OMEDIT cliquez ici : [e-OMEDIT Midi-Pyrénées](#)

Pour nous joindre : Téléphone : 05 34 30 27 54
Courriel : coremedims.mip.secretariat@wanadoo.fr

(Tous les « Flash info » sont disponibles au téléchargement sur [e-OMEDIT Midi-Pyrénées](#) / galerie de fichiers / « 13-Midi-Pyrénées – Flash Info »)

Si vous ne souhaitez plus recevoir le Flash Info, ou si au contraire vous souhaitez en être destinataire, prévenez-nous en nous adressant un message à : coremedims.mip.secretariat@wanadoo.fr

semaine de la sécurité des patients

partageons
l'information



ensemble, engageons-nous
pour des soins continus entre la ville et l'hôpital

du 24 au 28 novembre 2014

www.sante.gouv.fr/ssp

