Angine à streptocoque du groupe A?



Test de Diagnostic Rapide

angine

Le complément indispensable à votre examen clinique





▶ Pourquoi faire un TDR angine?


> Aucun signe clinique ni symptôme ne sont spécifiques des angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA). Complément indispensable de l'examen clinique, le TDR angine confirme l'étiologie à SGA. Il réduit le risque de passer à côté de cette angine bactérienne.*

Fiabilité du TDR angine : sensibilité > 90 %, spécificité > 95 %.

> Utiliser les antibiotiques de manière ciblée, c'est préserver leur efficacité. Le TDR angine permet de réserver les antibiotiques aux angines à SGA et évite ainsi de prescrire ces médicaments inutilement.

▶ Pour quel patient ?**

Devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée



Pas de nécessité de pratiquer un **TDR** angine, ni de traiter par antibiotiques chez :

- > Enfant < 3 ans (angine à SGA rare, Rhumatisme Articulaire Aigu exceptionnel)
- > Adulte + score de Mac Isaac < 2
- * Humair, Antonini Revaz, Bovier et al. Management of Acute Pharyngitis in Adults. Arch Intern Med 2006;166:640-644.
- ** AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé). Antibiothérapie par voie générale en pratique courante dans les infections respiratoires hautes de l'adulte et l'enfant. Recommandations. Octobre 2005.
- *** Sans facteur de risque de RAA (Rhumatisme Articulaire Aigu), ce résultat ne justifie pas de contrôle supplémentaire systématique par culture, ni de traitement antibiotique.



Au début de l'examen, devant des signes cliniques d'angine érythémateuse ou érythémato-pultacée :



Prélèvement



1 minute

Mise en contact du prélèvement avec les réactifs

Poursuite

de la consultation
en attendant
le résultat



Immersion du test



Lecture du résultat en fin de consultation

Dans la plupart des cas, le **TDR** angine se révèle négatif car les angines sont d'origine virale dans :

- · 75 à 90 % des cas chez l'adulte,
- · 60 à 75 % chez l'enfant.

En quelques minutes, avec le **TDR** angine, vous contribuez à préserver l'efficacité des antibiotiques.

L'Assurance Maladie se mobilise pour préserver l'efficacité des antibiotiques et lutter contre le développement des résistances bactériennes.

Elle met gratuitement des **TDR** angine à la disposition des médecins libéraux généralistes, pédiatres et ORL.

Comment recevoir gratuitement vos TDR angine?

> Commandez sur internet : https://espacepro.ameli.fr/



- > Ou commandez sur papier :
 - Demandez un bon de commande pré-identifié au correspondant TDR de votre Caisse ou à votre Délégué de l'Assurance Maladie.
 - Ou faites votre demande sur papier libre ou sur ordonnance comportant votre nom, votre adresse professionnelle, votre identifiant et votre spécialité. Indiquez clairement le nombre de boîtes de TDR angine souhaitées (20 tests par boîte) ainsi que l'adresse de livraison, si elle diffère de votre adresse professionnelle. A envoyer au correspondant TDR de votre Caisse ou à remettre à votre DAM, datée et signée.



