

CHLORAMINIPHENE®

Chlorambucil

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une seule présentation est disponible, sous plaquettes thermoformées:
- boîte de 30 gélules blanches opaques dosées à 2 mg.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

POSOLOGIE

Il est recommandé de prendre la dose journalière **en une fois le matin à jeun**.
La posologie est strictement personnelle et vous sera indiquée par votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments à votre médecin, même ceux vendus sans ordonnance. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diminution des globules blancs, signes d'infection	Limitez vos contacts avec les personnes malades. Lavez-vous souvent les mains. Faire pratiquer régulièrement des bilans sanguins.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits.
Diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dent souple. Evitez les anti-inflammatoires : aspirine, ibuprofène ...	En cas de saignement important, contactez le médecin prescripteur
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



Le CHLORAMINIPHENE® se prend en **une prise avec un grand verre d'eau, le matin à jeun.**



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les gélules dans votre poubelle. Les rapporter à votre pharmacien.



Les gélules ne doivent pas être ouvertes.



Pendant le traitement, il est important de boire davantage pour maintenir le bon fonctionnement du rein.



Si vous avez oublié de prendre vos gélules de Chloraminophène®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- fièvre ou signes infectieux;
- apparition de selles noires, de saignements de nez et crachats comportant du sang;
- difficulté à respirer ou toux anormale.