

XALKORI®

Crizotinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Xalkori® est disponible dans **les pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUE

Deux présentations sont disponibles, par boîtes de 60 sous plaquettes thermoformées :

- 200mg, gélules blanches et roses (5777,10 €)
- 250mg, gélules roses (5777,10 €).

A conserver à température ambiante

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle et vous sera expliquée par votre médecin.

La posologie usuelle est de **250mg, 2 fois par jour (soit 500mg/j)**, en continu, **au cours ou en dehors d'un repas**.

Les gélules ne doivent **pas être écrasées, ni dissoutes ou ouvertes**.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prenez aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets secondaires	Prévention	Conduite à tenir
Diminution des globules blancs	Limitez les contacts avec les personnes malades. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Prenez votre température avant chaque prise. Contactez le médecin en cas de signes infectieux : fièvre > 38°C, frissons ou sueurs, toux, brûlures urinaires. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
Allongement de l'intervalle QT	Contactez votre médecin en cas d'étourdissement, d'évanouissement ou de douleur à la poitrine	Une surveillance de votre cœur (électrocardiogramme) et un dosage des électrolytes pourront être envisagés.
Ralentissement du rythme cardiaque	Contactez votre médecin en cas d'étourdissement, d'hypotension, fatigue.	Une surveillance de votre fréquence cardiaque et de votre tension artérielle sera envisagée
Troubles visuels	Une vision double, floue, détériorée ou apparition de corps flottants.	Informez votre médecin si les troubles de la vision persistent ou s'aggravent. Un examen ophtalmologique doit être envisagé
Complication respiratoire	Des symptômes respiratoires non spécifiques tels qu'une toux ou une difficulté à respirer peuvent survenir	Informez votre médecin dès la survenue de ces symptômes. Une adaptation de la dose ou un arrêt du traitement sont à envisager

Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool	Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes et les bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées et vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement, faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Constipation	Buvez au moins 2L d'eau par jour, ayez une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière.	Alimentation riche en fibres, pratiquez une activité physique. Si constipation prolongée, contactez votre médecin pour un traitement laxatif.

Une perte d'appétit, une modification du sens du goût, une éruption cutanée, un gonflement des mains et/ou des pieds, des picotements dans un membre peuvent également être observées.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



- Les gélules de XALKORI® doivent être avalées entières (ni écrasées, ni dissoutes, ni ouvertes), de préférence avec de l'eau, au cours ou en dehors des repas.



- En cas d'oubli d'une prise, ne doublez pas la prise suivante :

- si la dose suivante est prévue dans plus de 6 heures : prenez immédiatement la dose oubliée
- si la dose suivante est prévue dans moins de 6 heures : ne pas prendre la dose oubliée. Prenez la dose à l'heure habituelle et notez cet oubli dans le carnet de suivi



- Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



- Le XALKORI® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer et aux hommes d'avoir recours à une méthode de contraception efficace pendant le traitement et 90 jours au minimum après la fin de celui-ci.



- Evitez de consommer des pamplemousses ou de jus de pamplemousse ou des tisanes à base de millepertuis pendant le traitement



- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules.



- Ne laissez pas votre traitement à la portée des enfants.



- Ne jetez pas les emballages, ni les gélules à la poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien.



- Prudence chez les utilisateurs et conducteurs de machines. XALKORI® peut entraîner des troubles de la vision, des étourdissements et de la fatigue.



- Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle. En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Contactez rapidement le médecin prescripteur en cas de :

- signes infectieux pour réaliser une NFS en urgence
- signes hémorragiques (saignement de nez, crachat comportant du sang...)
- d'essoufflement, d'hypoxie, épanchement pleurale, toux, dyspnée
- coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux, urines foncées, confusion et/ou désorientation