

TYVERB®

Lapatinib

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament doit être prescrit par un **médecin hospitalier spécialiste** en oncologie ou en hématologie ou par un médecin compétent en cancérologie. Il est disponible dans les **pharmacies de ville**.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Trois présentations sont disponibles contenant des comprimés pelliculés jaunes au même dosage soit **250mg**:

- Flacon de 140 comprimés
- Flacon de 84 comprimés
- Flacon de 70 comprimés (modèle hospitalier)


Les flacons sont munis d'un bouchon de sécurité enfant.

A conserver à température ambiante ne dépassant pas + 30°C. Conserver hors de portée des enfants.

POSOLOGIE

La posologie recommandée est variable selon l'indication :

- 1250 mg (soit **5 comprimés**) en une prise par jour, en continu, en association avec le XELODA® de J1 à J14 d'un cycle de 21 jours. **Vous ne devez pas prendre le TYVERB® et le XELODA® au même moment de la journée :**



- 1500 mg (soit **6 comprimés**) en une prise par jour, en continu, en association avec un inhibiteur de l'aromatase.
- 1000 mg (soit **4 comprimés**) en une prise par jour, en continu, en association avec le trastuzumab.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin. Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	En cas de diarrhée sévère, prévenir immédiatement votre médecin. Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes.
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière.	Boire au moins 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, contactez votre médecin.

Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Plaies douloureuses dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. Humidifiez la bouche avec un vaporisateur.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez le médecin prescripteur.
Picotement, gonflement, rougeur voire douleur de la paume des mains et de la plante des pieds	Evitez le soleil et toute exposition à la chaleur. Evitez les vêtements et les chaussures trop serrées. Utilisez un savon doux sans parfum. Evitez les tâches ménagères, les travaux irritants pour les mains, les sparadraps.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds, contactez immédiatement votre médecin. Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes (voir avec votre médecin).
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Toux, douleurs thoraciques		Informez immédiatement votre médecin.
Fatigue inhabituelle	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	Prudence en cas de conduite de véhicule.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



LE TYVERB® se prend quotidiennement en une prise par jour au moins une heure avant, ou une heure après un repas. Une fois le traitement instauré, la prise devra se faire toujours au même moment de la journée et au même moment par rapport au repas.



Ne pas couper ni écraser les comprimés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas consommer de **pamplemousse** ou de jus de pamplemousse au cours du traitement.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Tyverb®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver ce linge immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60-90°C).



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficulté à respirer, toux, essoufflements ou modification du rythme respiratoire.
- gonflement, rougeur et douleur de la paume des mains et de la plante des pieds.