

FARLUTAL®

Médroxyprogestérone

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou de ville (LISTE I). Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Une présentation est disponible:

- flacon de 30 comprimés blancs dosés à 500 mg (Non remboursé)

Conservez ce médicament dans un endroit frais et sec (température < à 25°C).

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle.

La dose recommandée est de 500 mg à 1000 mg par jour, soit un à deux comprimés, en fonction de la nature et du stade de la maladie.

Si votre posologie est de 1000mg/jour, elle est à répartir en 2 prises par jour.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Prise de poids, rétention des liquides, augmentation de l'appétit.	Elevez vos pieds quand vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Si ces effets secondaires vous incommode, parlez-en à votre médecin. En cas de prise de poids rapide et inattendue, contactez votre médecin.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Evitez les aliments froids, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Troubles de la vision, maux de tête, fatigue.	Prudence en cas de conduite de véhicule. Reposez vous souvent.	En cas de mal de tête important, de vue double ou de perte de la vision, avertissez votre médecin.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.

Des gonflements et des douleurs à la poitrine ainsi que des saignements entre les règles peuvent survenir pendant le traitement.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



Les comprimés de FARLUTAL® sont à prendre **avec un grand verre d'eau avant les repas**.

Evitez de boire des tisanes au millepertuis



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Ne pas laisser à portée des enfants.



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien.



Les femmes ayant une tendance au masque de grossesse doivent éviter l'exposition au soleil durant le traitement.



Si vous avez un diabète, parlez-en à votre médecin. Vous-même et votre médecin devrez contrôler la quantité de sucre dans votre sang pendant que vous prenez ce médicament.



Ne pas prendre FARLUTAL® en cas de grossesse et d'allaitement. Utilisez une méthode de contraception efficace. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Farlutal®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- Modification de la vision
- Mal de tête important.
- Gonflement anormal et douleur au niveau d'un membre.
- Difficulté à respirer.