

ANANDRON®

Nilutamide

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Ce médicament peut être prescrit par un **médecin hospitalier** ou de **ville (LISTE I)**. Il est disponible dans les pharmacies de ville sur ordonnance.

PRESENTATIONS ET CARACTERISTIQUES

Deux présentations sont disponibles, sous plaquettes thermoformées:

- Boîte de 90 comprimés blancs dosés à 50 mg
- Boîte de 30 comprimés blancs dosés à 150 mg

Conserver à une température se situant entre 15 et 30 °C.
Protéger de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

POSOLOGIE

La posologie est strictement personnelle.

-Dose de départ: 300 mg par jour, durant le premier mois du traitement.

-Dose d'entretien: 150 mg par jour.

La dose quotidienne peut être prise en une fois ou répartie en plusieurs prises.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. **N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance à votre médecin.**

Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Troubles visuels	Portez des verres teintés	Prudence pour les utilisateurs de véhicules ou de machines Evitez de conduire la nuit.
Nausées et vomissements	Boire entre les repas. Eviter les aliments frais, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissements, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.

Bouffées de chaleur	Évitez les déclencheurs comme l'alcool, la caféine, le chocolat, les aliments chauds et épicés, le stress et la chaleur	Faites des exercices légers (marche). Restez au frais. Portez des vêtements légers. Buvez régulièrement de l'eau.
---------------------	---	---

Un gonflement et des douleurs à la poitrine peuvent survenir.

La liste de ces effets indésirables n'est pas complète, d'autres peuvent survenir. Pour plus de renseignements, consulter la notice du médicament.

CONSEILS AUX PATIENTS



L'ANANDRON® se prend avec un grand verre d'eau. La dose quotidienne peut être prise en une fois ou répartie en plusieurs prises.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.



Pour les patients ayant des difficultés à avaler, les comprimés d'ANANDRON® peuvent être broyés.



Ne pas laisser à portée des enfants



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. Rapportez les à votre pharmacien



Évitez de boire de l'alcool pendant le traitement.



Si vous avez oublié de prendre vos comprimés d'Anandron®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et noter cet oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Contactez rapidement le médecin en cas de :

- difficulté à respirer ou de toux anormale.
- démangeaison, douleurs abdominales, coloration foncée des urines.